

POURQUOI L'HOMÉOPATHIE EN SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT?

- Absence de toxicité et d'interaction médicamenteuse¹
- Favorise la tolérance et l'observance des traitements conventionnels du cancer²
- Prise en charge à 100% dans le cadre de l'ALD

PROTOCOLE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA CHIRURGIE

Recommandations de pratique clinique³

EN PRÉ-OPÉRATOIRE

Prévention de l'anxiété

VEILLE DE L'OPÉRATION - MATIN

Gelsemium sempervirens 15 CH

Prévention du choc opératoire

VEILLE DE L'OPÉRATION - SOIR

Arnica montana 30 CH • 1 dose

EN POST-OPÉRATOIRE

Dans tous les cas:

A LA REPRISE DE BOISSON

Arnica montana 30 CH 1 dose

En cas de chirurgie sénologique

A LA REPRISE DE BOISSON

Arnica montana 30 CH • 1 dose



LE LENDEMAIN DE L'OPERATION

Bellis perennis 30 CH • 1 dose

En cas de chirurgie digestive ou pelvienne

A LA REPRISE DE BOISSON

Arnica montana 30 CH • 1 dose



2 HEURES APRES

Opium 15 CH • 1 dose



Raphanus niger 5 CH

• 3 granules 3 fois par jour jusqu'à reprise du transit



LE LENDEMAIN DE L'OPERATION

Opium 30 CH • 1 dose

Autres symptômes voir : www.shisso-info.com/fr-recommandations

En cas de résultats thérapeutiques insuffisants, une consultation homéopathique est recommandée.

^{2.} Frass M, Friehs H, Thallinger C, et al. Influence of adjunctive classical homeopathy on global health status and subjective wellbeing in cancer patients - A pragmatic randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2015 Jun; 23(3):309-17.




^{1.} Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, et al. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2).

PROTOCOLE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA CHIRURGIE



Exemple de prescription



GELSEMIUM SEMPERVIRENS 15 CH, 1 dose globule le matin, la veille de l'intervention ARNICA MONTANA 30 CH, 1 dose globule le soir, la veille de l'intervention

ARNICA MONTANA 30 CH, 1 dose au moment de la reprise de la boisson

[Chirurgie sénologique] BELLIS PERENNIS 30 CH 2 doses :1 dose le lendemain de l'intervention, à renouveler si douleur

[Chirurgie digestive ou pelvienne] OPIUM 15 CH 1 dose dès que possible après l'opération,

RAPHANUS NIGER 5 CH 3 x 3 granules par jour jusqu'à la reprise du transit et des gaz OPIUM 30 CH 1 dose le lendemain

Les granules sont à laisser fondre en bouche en dehors des repas.



Version numérique disponible sur www.shisso-info.com/fr-recommandations

