




# SHISSO

Société Homéopathique Internationale  
de Soins de Support en Oncologie

## POURQUOI L'HOMÉOPATHIE EN SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT ?

- Absence de toxicité et d'interaction médicamenteuse<sup>1</sup>
- Favorise la tolérance et l'observance des traitements conventionnels du cancer<sup>2</sup>
- Prise en charge à 100% dans le cadre de l'ALD

## PROTOCOLE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA CHIRURGIE



Recommandations de pratique clinique<sup>3</sup>

### EN PRÉ-OPÉRATOIRE

Prévention de l'anxiété

VEILLE DE L'OPÉRATION - MATIN

Gelsemium sempervirens D30 • 1 dose

Prévention du choc opératoire

VEILLE DE L'OPÉRATION - SOIR

Arnica montana D30 • 1 dose

### EN POST-OPÉRATOIRE

Dans tous les cas :

A LA REPRISE DE BOISSON

Arnica montana D30 • 1 dose

En cas de chirurgie sénologique

A LA REPRISE DE BOISSON

Arnica montana D30 • 1 dose



LE LENDEMAIN DE L'OPÉRATION

Bellis perennis 30 CH • 1 dose

En cas de chirurgie digestive ou pelvienne

A LA REPRISE DE BOISSON

Arnica montana D30 • 1 dose



2 HEURES APRES

Opium 15 CH • 1 dose



PUIS

Raphanus niger 5 CH

• 3 granules 3 fois par jour  
jusqu'à reprise du transit



LE LENDEMAIN DE L'OPÉRATION

Opium 30 CH • 1 dose

Autres symptômes voir : [www.shisso-info.com/fr-recommandations](http://www.shisso-info.com/fr-recommandations)

En cas de résultats thérapeutiques insuffisants, une **consultation homéopathique est recommandée.**


1. Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, et al. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2).

2. Frass M, Friehs H, Thallinger C, et al. Influence of adjunctive classical homeopathy on global health status and subjective wellbeing in cancer patients - A pragmatic randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2015 Jun; 23(3):309-17.

3. Bagot JL, Karp JC, Messerschmitt C, et al. Therapeutic recommendations of the International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology «(IHSSCO) revhom 2017;8:e47-e55



# PROTOCOLE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA CHIRURGIE



Exemple de prescription

<b>cerfa</b> n° 14465*01		<b>Ordonnance bizonne</b> Articles L. 322-3, 3° et 4°, L. 324-1 et R. 161-45 du Code de la sécurité sociale.	
Identification du prescripteur <i>(nom, prénom et identifiant)</i>		Identification de la structure <i>(raison sociale du cabinet, de l'établissement et n° AM, FINESS ou SIRET)</i>	
Identification du patient <i>(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu)) (à compléter par le prescripteur)</i>  <i>n° d'immatriculation (à compléter par l'assuré(e))</i>			
<b>Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)</b> <b>(AFFECTION EXONÉRANTE)</b>			
<p>GELSEMIUM SEMPERVIRENS D30, 1 dose globule le matin, la veille de l'intervention ARNICA MONTANA D30, 1 dose globule le soir, la veille de l'intervention</p> <p>ARNICA MONTANA D30, 1 dose au moment de la reprise de la boisson</p> <p>[Chirurgie sénologique] BELLIS PERENNIS 30 CH 2 doses :1 dose le lendemain de l'intervention, à renouveler si douleur [Chirurgie digestive ou pelvienne] OPIUM 15 CH 1 dose dès que possible après l'opération, RAPHANUS NIGER 5 CH 3 x 3 granules par jour jusqu'à la reprise du transit et des gaz OPIUM 30 CH 1 dose le lendemain</p> <p>Les granules sont à laisser fondre en bouche en dehors des repas.</p>			



Version numérique disponible sur [www.shisso-info.com/fr-recommandations](http://www.shisso-info.com/fr-recommandations)